

Estudio modificado de ingestión de bario

Tu hijo tiene una cita para una prueba de rayos X llamada estudio de trago de bario modificado. Esta prueba muestra cómo los alimentos y líquidos se mueven a través de la parte superior del tracto digestivo cuando tu hijo mastica y traga. La prueba se realizará en el Departamento de Radiología. Revisa esta información antes de la prueba de tu hijo:

Qué esperar: durante la prueba, tu hijo comerá y beberá alimentos que contienen bario. El bario es un material blanco y espeso que ayuda a que los rayos X puedan ver el tracto digestivo. El bario es un material seguro y no tóxico. Se lo usa para pruebas de rayos X en el tracto digestivo. El bario no es un medicamento y no debe tomarse con otros medicamentos. El bario puede causar estreñimiento. Se recomienda beber mucha agua durante la prueba. El bario puede manchar la ropa y la piel. Se recomienda usar ropa oscura y quitarse los zapatos antes de la prueba. El bario puede manchar la piel si se aplica. Se recomienda lavarse las manos después de la prueba. El bario puede causar reacciones alérgicas. Se recomienda avisar al médico si tu hijo tiene una alergia a cualquier medicamento o alimento. El bario puede causar náuseas y vómitos. Se recomienda beber mucha agua durante la prueba. El bario puede causar diarrea. Se recomienda beber mucha agua durante la prueba. El bario puede causar dolor abdominal. Se recomienda beber mucha agua durante la prueba. El bario puede causar hinchazón abdominal. Se recomienda beber mucha agua durante la prueba. El bario puede causar gases. Se recomienda beber mucha agua durante la prueba. El bario puede causar estreñimiento. Se recomienda beber mucha agua durante la prueba. El bario puede causar reacciones alérgicas. Se recomienda avisar al médico si tu hijo tiene una alergia a cualquier medicamento o alimento. El bario puede causar náuseas y vómitos. Se recomienda beber mucha agua durante la prueba. El bario puede causar diarrea. Se recomienda beber mucha agua durante la prueba. El bario puede causar dolor abdominal. Se recomienda beber mucha agua durante la prueba. El bario puede causar hinchazón abdominal. Se recomienda beber mucha agua durante la prueba. El bario puede causar gases. Se recomienda beber mucha agua durante la prueba.

Si tienes alguna pregunta, comunícate con el médico que ordenó esta prueba o con el departamento de Servicios Terapéuticos.